

冠县人民医院检验检查

检查项目	检查流程	须知	注意事项	报告获取时间	报告获取方式
B超室	超声科分诊处登记 ↓ 携带①电子二维码/就诊卡 ②检查申请单 ↓ 候诊区等候叫号 ↓ 叫到几诊室到几诊室就诊 东 西 候诊室 叫号电子屏 一诊室 二诊室 三诊室 四诊室 五诊室	B超室实行24小时急诊检查服务。	1、腹部（肝胆胰脾）检查请在前晚吃清淡食物至检查前勿进食及饮茶；该检查应在钡餐及胃镜检查前进行，喝钡餐者应3天后再检查； 2、盆腔检查及泌尿系检查需充盈膀胱； 3、儿童需睡着时检查，必要时应给予镇静剂。	急诊病人：10分钟 普通病人：20分钟 特殊疑难病例会诊后30分钟发报告	诊室直接领取
CT	1、将申请单交到登记处，门诊患者需出示就诊码。 2、在候诊区等待呼叫。 3、摘除检查部位区域内的	医护人员需要一个安静的工作环境，请	1、检查前须将详细病史及各种检查结果告知CT医生，如果有自己保存的X线片等资	普通患者1—2小时，急诊患	自助打印

室	金属物（如发夹、耳环、项链、腰带、手机、钥匙、硬币等）。 4、被呼叫手进入扫描室。 5、按医生指导摆好体位，请保持体位不变至扫描结束。 6、检查完成后告知取结果时间，到时在自助打印机扫码取片及报告单。 7、返回开单医生处续诊。	您 勿 进 入 办 公 室， 谢 谢 您 的 配 合。	料需交给 CT 医生以供参考。 2、育龄期妇女请确认未怀孕；婴幼儿需镇静以取得良好扫描效果。 3、腹 部 CT 扫 描 者（肝、胆、脾、胰）请空腹，扫描前按医护人员 要 求 喝 水 500-1000ml。 4、盆腔 CT 扫描者需留尿，以清晰显示膀胱及其邻近组织。 5、增强扫描前要向医生说明患者有无药物过敏情况，是否患有哮喘、荨麻疹等过敏性疾病，以使医生能注意防止造影剂过敏等危险情况。 6、CT 增强扫描或儿童、神志不清者，需有健康人陪同。陪同者应穿好工作人员提供的 X	者 20 分 钟	机 扫 码 取 片 及 报 告 单。
---	--	------------------------------------	---	-----------------	---------------------------

			线防护服。 7、检查时听众技术人员的指导，如保持体位不动，配合检查进行平静呼吸、屏气等。		
磁共振	携带①电子二维码/就诊卡；②纸质检查申请单——磁共振登记室预约登记——工作人员核对检查单，并和患者沟通，告知检查注意事项，患者按约诊时间做好检查前准备——候诊区等待检查——叫号后，工作人员带患者进入检查室，摆好体位，进行扫描——检查完毕，工作人员给患者取报告的凭证，并告知取报告时间、地点	MR 检查时间相对较长，检查中机器会发出较大噪声，请做好准备，耐心配合。	1、体内有心脏起搏器、动脉瘤夹、人工耳蜗的受检者禁止做 MR 检查；有放置支架、人工股骨头、骨折钢板固定等或其他金属植入物的受检者建议您先咨询手术医生可否进行 MR 检查，并在检查前向 MR 室工作人员详细说明。 2、有下列情况请务必向工作人员说明，有无：1）手术史 2）金属物品植入史 3）假牙、电子耳蜗及义眼义肢等 4）药物过敏史 5）早期妊娠 6）节育	1、常规检查，被检查者在做完检查后 2 个小时取结果； 2、急诊患者 30 分钟取结果； 3、特殊检查及疑难病例：检查完成后由工	自助打印扫描取片及报告单。

		环 7) 近期有无金属碎屑溅入史。 3、受检者请勿穿戴含金属物质的内衣和饰品, 请尽量穿着不带金属拉链、纽扣、饰物的外衣裤; 请勿使用任何化妆品 (包括唇膏、眼影、睫毛膏、染发等)。 4、受检者及家属在进入 MR 室前请将所携带的含金属及磁性物品如: 手机、钥匙、手表、硬币、打火机、腰带、各种磁卡、眼镜及假牙等寄存在更衣箱内; 贵重物品请另行妥善保管。 5、腹部检查受检者前一日晚8时后禁食禁饮。泌尿系统及盆腔检查者除禁食禁饮外并须保持膀胱适度充盈。 有节育环女性不适宜	作人员和病人说明情况, 并电话通知出报告时间。	
--	--	---	--------------------------------	--

		做盆腔检查。 6、受检者应于检查前二十分钟到达，以做好相应准备工作。凡预约后不能按时前来者需提前通知本科室并办理相关手续，本科室有权重新安排时间。 7、已婚适龄女性受检者在检查前请确认自己并无怀孕，MRI 检查以及注射的钆对比剂对早期妊娠的影响暂时无法预计。 8、危重受检者请有关科室的医护人员陪同检查。不能合作的受检者需请有关科室镇静或麻醉后方能检查。 9、由于静脉注射造影剂是电脑控制压力注射器进行，另外，部分老年人或化疗后病人的血管硬化、脆弱或某	
--	--	---	--

			病人血管细滑以及造影剂的高渗和化学作用等因素引起局部渗漏可造成皮下软组织肿胀，疼痛，麻木，甚至溃烂，坏死等。如出现以上情况。请立即向医护人员报告。		
放射科	患者就诊——持门急诊或住院医师开具的申请单并缴费后——登记室窗口登记编注影像号，发放自助打印片袋和条码——①数字摄影 DR、乳腺摄影 MG、口腔摄影 PX 完成后②数字胃肠 RF、造影检查完成后——报告及 X 线照片一小时后至自助打印机扫码领取——特殊情况或疑难病例，请到登记室咨询情况	对于特殊情况不能及时做出诊断的病例，视情况不同提出以下措施： 1、结合透视、问病史、结合其他检查结果，进一步检查等，然后做出完整的诊断	1、人体受到放射线照射后，可能产生潜在危害； 2、非特殊需要，受孕 8-15 周的孕妇不得进行下腹部放射影像检查，其他孕期的孕妇、婴幼儿、少年儿童谨慎； 3、要权衡利弊，在没有其他更好的检查方法时，才用放射线检查； 4、检查时，每次只容许 1 人进入机房，并对	常规 X 线摄片，在检查结束后 60 分钟后出胶片及诊断报告，急症患者、摄片后 30 分钟内出急症报告或	自助打印机扫码取片及报告单。

		意见。 2、疑难病例需要上级医师会诊，要顺延几天，做出完整的诊断意见。	邻近照射的敏感器官和组织进行屏蔽防护。 因患者病情需要其他人员陪检时，应当对陪检者采取防护措施； 5、不得将 X 射线胸部检查列入对婴幼儿及少年儿童体检的常规检查项目； 6、尽量要求医生以胸部 X 射线摄影代替胸部荧光透视检查； 7、有权拒绝因资料管理、受检者转诊等原因使受检者接受不必要的重复照射。	将结果直接告知临床医师。 消化道造影检查一般要在上午 11 点前出胶片及报告。特殊检查一般在检查结束后 60 分钟内出具诊断报告	
肺功能	医师根据病情开具肺功能检查医嘱及电子申请单一一患者携带①电子二维码/就诊卡②纸质检查申请单到门诊二楼西侧肺功能室	哪些患者不宜做肺功能 1、近周内有大咯血、	良好的配合对肺功能检查至关重要。为了使您尽快掌握检查方法，正确配合医生的操作，获得可靠的结果，请您	检查完毕 20 分钟后领取报告单	肺功能直接

	——按顺序进行肺功能检查——检查完毕 20 分钟后领取报告单	消 化 道 出 血、气胸、肺大疱 2、严重低氧血症者， 支 气 管 扩 张剂过敏 3、不 稳 定 性心绞痛、心 肌 梗 死 1 个 月 内 的、高血压危象、顽固性高血压 4、近 1 个 月 内 患 脑 卒 中 、 行 眼 睛 、 胸腔、腹腔手术 5、有 活 动 性 呼 吸 道 传染病、感 染 病	按如下要求进行准备： • 肺功能测定前，受检者应当避免吸烟、饮酒、剧烈运动和过度的进食，不要穿过于紧身的衣物 • 主观因素对肺功能检查的影响较大，因此受检者应尽量保持放松，听从医务人员的指挥，努力配合检查，方能获得准确的肺功能数据。检测过程中如有不适，应及时告知医务人员，以免发生意外 • 检查当天可以正常进食早餐		领 取
--	---------------------------------------	---	--	--	------------

		6、意识障碍、大脑不能正常反应不能够配合的患者 7、已确诊胸腔动脉瘤、主动脉瘤、脑动脉瘤未行有效治疗			
骨密度	医师根据病情开具骨密度检查、医嘱及电子申请单一一患者携带①电子二维码/就诊卡②纸质检检查申请单到门诊二楼西侧骨密度检查——按顺序进行呼气试验检查——检查完毕后，5——10 分钟后领取报告单	超声骨密度适用于 0——99 岁的人群	1、做骨密度检查时，患者衣服应宽松舒适。 2、有皮肤溃烂者，应在皮肤完整的上下肢做骨密度的检查。 3、检查时患者应安静坐稳，避免随意扭动。	5 —— 10 分钟后领取报告单	骨密度室直接领取

呼 气 试 验	医师根据病情开具呼气试验检查、医嘱及电子申请单——患者携带①电子二维码/就诊卡②纸质检查申请单到门诊二楼西侧呼气实验室检查——按顺序进行呼气试验检查——第一次呼气与第二次呼气期间须等待 30 分钟间隔时间——检查完毕后，5——10 分钟后领取报告单	在近一周有消化道出血的患者等到出血停止一周以后再进行检测幽门螺旋杆菌	1、做检查前应空腹、禁食、禁水。 2、检查前一个月应禁服抗生素及抑酸药物。	检查完毕后，5——10 分钟后领取报告单	呼气实验室直接领取
肌 电 图	门诊医生开具肌电图检查医嘱及电子申请单——患者携带①电子二维码/就诊卡②纸质检查申请单到门诊二楼西侧肌电图室登记、划价——按顺序进行肌电	肌电图检查时间较长，一般半小时，有时需 1-2 小时，需患者	1、检查前不宜空腹，尽量穿宽松衣物，保持体表温度在 32℃ 以上。 2、肌电图为一种创伤性检查，放电或插针时会引起不适感，需要病	检查完毕后 10——30 分钟领取报告单，个	肌电图室直接

	图检查——检查完毕后 10—30 分钟领取报告单，个别患者根据病情复杂程度可能适当延长	耐心等待。	人配合。进行针极肌电图检查项目患者，扎针部位 24 小时避免接触水。 3、有以下情况禁做肌电检查：装有心脏起搏器、严重凝血功能障碍、严重心脑血管疾病、有精神病史、不合作者、晕针患者。易患反复性及系统性感染者不宜行肌电图检查。 4、重症肌无力应停药 18-24 小时后检测，肌酶检查要在肌电图前进行。 5、检查部位皮肤肿胀、破溃明显，需好转后进行检测。	别患者根据病情复杂程度可能适当延长	领取
脑电图	医师根据病情开具脑电图检查医嘱及电子申请单一一患者携带：①电子二维码/就诊卡②纸质检查申请单	1、脑电图检查无痛无害，检查时要保持	1、检查前一天要洗头，且不能使用发油、发胶、摩丝等美发产品。 2、检查时尽量不穿化	检查完毕后 10 分钟领取报告	脑电图室

	到门诊二楼西侧脑电图室——按顺序进行脑电图检查——检查完毕后 10 分钟领取报告单	自然，不要有恐惧心理，检查时不要携带手机等电子产品。 2、检查时全身肌肉放松，按照医生要求，睁眼、闭眼、深呼吸等。 3、对无法配合的小儿及精神异常者可适当用镇静剂后做睡眠脑电图检查。	纤衣服，以免产生静电干扰，建议穿纯棉质衣服。 3、检查前需进食，不宜空腹。 4、检查前 24 小时要停止服用镇静剂、兴奋剂及其他作用于神经系统的药物，癫痫病人正在服用抗癫痫药物时，除有特殊诊断需要，一般不应停药。	单	直接领取
碎石	出示最新超声报告，治疗申请单——确定能否行体	术中能安静仰卧 30	妊娠期绝对严禁疤症 相对禁疤症主要有：未		

科	外冲外冲击波碎石治疗——携带电子就诊二维码——术前病人准备充足,进行治疗	分钟以上,不能配合者必要时术前30分钟应用止痛剂 治疗后遵医嘱	纠正的凝血功能障碍;严重的心脏疾病;结石远端解剖性梗阻;未控制的尿路感染、肾功能不全;严重糖尿病;传染病活动期;严重的骨骼畸形或重度肥胖	无	无
心电图室	心电图室取号机处取号——携带1、电子二维码/就诊卡2、检查申请单——候诊区等候叫号——到号即去心电图室检查	检查的时候要放松心情,平静呼吸,可以有效地避免窦性心律不齐现象发生,保证检查的准确性。	1、检查前,保持良好睡眠。良好的睡眠可以有效保障心电图检查结果的准确性,避免因失眠现象引起窦性心动过速,而导致心电图检查不合格的现象发生。因此,检查心电图前一晚不要喝浓咖啡,也不要进食过饱,以免影响睡眠。 2、不要随意服用药物,某些药物会引起心跳加速或者减慢的现象发生。比如美托洛尔有可能引起心动过缓,而	急诊病人:5分钟 普通病人:10分钟	心电图室直接领取

			含有麻黄碱的感冒药， 有可能引起窦性心动 过速。		
--	--	--	--------------------------------	--	--